



Обработки със стимулатора на растеж ГИБЕРЛИНА GA3

При ДОМАТИТЕ и ГРОЗДЕТО, *Увеличава производството с 16-20%/ха*,

Разтварят се **3 таблетки / 200 л вода / ха**; Прилагат се 3 (три) листни обработки:

При ДОМАТИТЕ:

- фаза I, след засаждане, преди цъфтеж;
- фаза II, след цъфтеж;
- фаза III, в началото на връзването на цветовете.

При ГРОЗДЕТО:

- фаза I, преди цъфтеж;
- фаза II, след цъфтеж;
- фаза III, в началото на образуването на гроздовете.

При КАРТОФИТЕ, *Увеличава продукцията с >30%/ха*

Разтварят се **10 таблетки / 200 л вода / ха**; Прилагат се 3 (три) листни обработки:

- фаза I, 10-15 дни от покълване;
- фаза II, преди разцъфване или 2-3 седмици от първата обработка;
- фаза III, в началото на образуването на луковичите.

При ПШЕНИЦАТА, *Увеличава продукцията с 5÷8%/ха*

Разтварят се **3 таблетки / 200 л вода / ха**; Прилагат се 2 (две) листни обработки:

- фаза I, в края на образуването на страничните израстъци и началото на образуването на сламката;
- фаза II, 2-3 седмици след първата обработка или при появата на класовете.

При ОРИЗА и ЕЧЕМИКА, *Увеличава продукцията с 15÷20%/ха*

Разтварят се **3 таблетки / 200 л вода / ха**; Прилагат се 2 (две) листни обработки:

- фаза I, в началото на образуването на сламката;
- фаза II, при появата на класове.

При СЛЪНЧОГЛЕДА, *Увеличава продукцията с 15÷20%/ха*

Разтварят се **3 таблетки / 200 л вода / ха**; Прилагат се 2 (две) листни обработки:

- фаза I, При образуване а 3-4 листа;
- фаза II, При образуване на 10-12 листа.

При ЛЮЦЕРНА, ДЕТЕЛИНА, ПАСИЩА, *Увеличава производството на суха маса с 20-40%/ха*

Разтварят се **10-20 таблетки / 200 л вода / ха**; Прилага се една обработка, по всяко време през периода на растежа на люцерната.

СЛАДКИ ЧЕРЕШИ: **10 таблетки / 1.000 л**, листно нанасяне 2 седмици преди перитба; *Получават се по-теърди, по-здрави плодове, с красив външен вид, по-продължителна издръжливост на рафта, късна поява на петна.*

ЯГОДИ: **14 таблетки / 200 л / ха**, първо нанасяне **20 дни** преди цъфтеж; могат да се приложат още две обработки след цъфтежа, на 15 дни разстояние между тях. *Увеличава се броят, размера и качеството на плодовете.*

ЧУШКИ / КАМБИ: **10 таблетки / 200 л / ха**, прилага се една обработка през периода на образуване на цветовете. *Увеличава броя плодове, размера и качеството им, включително и сухата маса.*

ТИКВИЧКИ / САЛАТА / СПАНАК: **9 таблетки / 300 л / ха**, прилага се една единствена обработка 4-5 седмици преди прибиране на реколтата. *Стимулира растежа, увеличава устойчивостта на студ.*

Обработките се прилагат в рамките на 24 часа от приготвянето на разтвора, прилагането се извършва в прохладно време, сутринта или вечерта, когато вероятността за валежи през следващите 4 часа, е минимална. В случай на дъжд след обработка, обработката се повтаря с ½ от първоначалната препоръчителна доза.

Да се прилагат и спазват и инструкциите от Информационния лист за безопасност !

Продукт, оторизиран от:

- Министерството на земеделието; - Министерството на здравеопазването; - Министерството на околната среда;

Разрешително №: RO-TOP 621/29.04.2014