

## Tratamente cu Stimulatorul de Crestere Giberelina GA3 (*produsul NU este periculos sau toxic*)

Produs autorizat de: - Ministerul Agriculturii; - Ministerul Sanatatii; - Ministerul Mediului;  
Omologare RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT: 621/29.04.2014

### La TOMATE si VITA DE VIE, *Creste productia cu 16-20%/ha,*

Se dizolva **3 tablete / 200 L apa / ha**; Se aplica 3 (trei) tratamente foliare:

#### La TOMATE:

- faza I, după plantare, înainte de înflorire;
- faza II, după înflorire;
- faza III, la începutul legării florilor.

#### La VITĂ DE VIE:

- faza I, premergator înfloririi;
- faza II, după înflorire;
- faza III, la începutul formării ciorchinilor.

### La CARTOFI, *Creste productia cu >30%/ha*

Se dizolva **10 tablete / 200 L apa / ha**; Se aplica 3 (trei) tratamente foliare:

- faza I, la 10-15 zile de la rasarire;
- faza II, premergator înfloritului sau la 2-3 saptamini de la primul tratament;
- faza III, la inceputul formarii tuberculilor.

### La GRÂU, *Creste productia cu 5÷8%/ha*

Se dizolva **3 tablete / 200 L apa / ha**; Se aplica 2 (doua) tratamente foliare:

- faza I, la sfarsitul înfratirii si începutul formarii paiului;
- faza II, la 2-3 saptamîni dupa primul tratament sau la aparitia înspicarii.

### La OREZ si ORZ, *Creste productia cu 15÷20%/ha*

Se dizolva **3 tablete / 200 L apa / ha**; Se aplica 2 (doua) tratamente foliare:

- faza I, la începutul formarii paiului;
- faza II, la aparitia înspicarii.

### La FLOAREA SOARELUI, *Creste productia cu 15÷20%/ha*

Se dizolva **3 tablete / 200 L apa / ha**; Se aplica 2 (doua) tratamente foliare:

- faza I, la formarea a 3-4 frunze;
- faza II, la formarea a 10-12 frunze.

### La LUCERNA, TRIFOL, PAȘUNE, *Creste productia in masa uscata cu 10-30%/ha*

Se dizolva **10-20 tablete / 200 L apa / ha**; *se aplica un tratament pentru fiecare coasa*, oricand in perioada de crestere a lucernei.

CIRESE, VISINE: **10-15 tablete / 1.000 L** (se dubleaza doza la pomi mai batrani de 15 ani), O singura aplicare foliara la 2 saptamani dupa inflorire sau 2-3 saptamani inainte de cules; *Rezulta fructe mai mari, ferme, aspect frumos, rezistenta la raft mai mare, intarzie aparitia petelor. Combate virusul galben!*

CAPSUNI: **14 tablete / 200 L / ha**, prima aplicare la **20** de zile inainte de inflorire; se pot aplica inca doua tratamente dupa inflorire, la 15 zile distanta intre ele. *Creste numarul, marimea si calitatea fructelor.*

ARDEI IUTE / ARDEI GRAS: **10 tablete / 200 L / ha**, se aplica un tratament in perioada formarii florilor. *Creste numarul de fructe, marimea si calitatea acestora, inclusiv creste masa uscata.*

DOVLECEI / SALATA / SPANAC: **9 tablete / 300 L / ha**, se aplica un singur tratament cu 4-5 saptamani inainte de recoltare. *Stimuleaza cresterea si mareste rezistenta la frig.*

*Tratamentele se aplica in maxim 24 de ore de la prepararea solutiei, aplicarea se face pe vreme racoroasa, dimineata sau seara, cand probabilitatea de ploaie in urmatoarele 4 ore, este minima.  
In caz de ploaie dupa tratament, se repeta tratamentul cu ½ din doza initial recomandata.  
A se respecta instructiunile din Fisa cu Date de Securitate!*